

DATA: 08/05/2017

## **PRESSEGUER - NECTARINA**

### **CENDROSA-MONILIA**

Recordeu que fins a l'enduriment del pinyol és recomanable mantenir protegits els fruits amb antioïdis específics.

L'estratègia de tractament serà en funció de la data prevista de recol·lecció i la sensibilitat de les diferents varietats. Per facilitar el maneig fem 3 grups :



#### **grup1.- VARIETATS A RECOL·LECTAR FINS A LA BIG TOP:**

##### **Dosis per 1000 l de brou**

- **ATEMI** (ciproconazol 10%) TS:14 ..... 200 gr.
- **THIOVIT** (sofre mullable 80%), TS: -- ..... 6,25 kg.

#### **grup2.- VARIETATS A RECOL·LECTAR 15 DE JULIOL AL 15 D'AGOST:**

##### **Dosis per 1000 l de brou**

- **TEBUCONAZOL 25%** TS: 7 ..... 0.75 kg.
- **THIOVIT** (sofre mullable 80%), TS: -- ..... 6,25 kg.

#### **grup3.- VARIETATS A RECOL·LECTAR A PARTIR DEL 15 D'AGOST:**

##### **Dosis per 1000 l de brou**

- **TEBUCONAZOL 25%** TS: 7 ..... 0.75 kg.
- **THIOVIT** (sofre mullable 80%), TS: -- ..... 6,25 kg.
- **MANCOZEB 80% TS:28** ..... 2,50 kg.
- **METARAM FLOW** (tiram 50%), TS: 15 ..... 5,00 lt.

## ANARSIA I GRAFOLITA

Durant aquest mes s'està desenvolupant el primer vol d'anarsia (*Anarsia linaetella*) i es produirà el final de la primera generació i l'inici de la segona de **Grafolita** (*Cydia molesta*).



Es convenient vigilar els brots en creixement actiu per si s'observa danys. S'ha de tractar en cas de detecció de danys o en cas de superació del llindar en trampa (7 captures/trampa\*setmana) per Anarsia i 15 captures d'adults/trampa i setmana en el cas de grafolita

Per tal de conèixer a nivell de parcel·la si cal o no tractar és recomanable instal·lar trampes de feromona sexual (si no estan col·locades).

Per les dades de les trampes control de moment no cal tractar. Si teniu captures en les vostrestrampes, cal comentar estratègia a seguir

## PUGÓ VERD (*Myzus persicae*)

Cal vigilar les plantacions i tractar en cas d'observació de reinfestacions amb colònies actives. És molt important canviar de família química en cas de repetir l'aplicació per evitar resistències

Es molt important mullar bé i comentar estratègia a seguir en funció de la data de recol·lecció



## XANTOMONA ARBORICOLA :



S'està observant símptomes en finques de la zona

La taca bacteriana és una malaltia produïda per un bacteri que pot afectar a tots els fruiters de pinyol. Els símptomes a les fulles a vegades es poden arribar a confondre amb els del cribat. Es manifesten com unes petites taques d'1 a 5 mm de diàmetre, de forma irregular o angulosa,

de color verd pàl·lid o groguenc, limitades pels nervis de la fulla i es necrosen.

Si observeu aquest símptomes, consulteu estratègia a seguir.