


Data: 1 - 3 - 2016

PRESSEGUER – NECTARINA: TRACTAMENTS EN CAIGUDA DE PETALS

Estadi G, caiguda de pètals



Els tractaments aniran dirigits a combatre TRIPS, MONILIA i CENDROSA, es farà a l'estat fenològic G. L'estratègia a seguir serà :

Trips: per tal d'evitar danys en l'epidermis dels fruits, a les plantacions de nectarina i de presseguer de pell fina vermella normalment afectades es recomana realitzar un nou tractament a inici de caiguda de pètals (estadi G).

Monilia sp. Fusicoccum sp : fins a caiguda de pètals es poden produir atacs

d'aquests fongs. En aquesta època la Monilia produeix l'asseccament de flors que resten fortament adherides als brots. En presència d'humitats o pluges cal repetir-lo a plena floració o primers pètals caiguts. També afecta a l'albercoquer i altres fruiters

MAVRIK (NR 16417, tau-fluvalinat 10%)

0.050 l/hl (consultar)

METARAM (NR 19545, tiram de 50%)

0.35-0.50 l/hl

THIOVIT (NR 12901 sofre 80%)

1 kg/hl

ORIOUS (NR 24504 tebuconazol 20%)

0.075 l /hl

Nota informativa:

Monilia fructicola: es molt important tenir cura d'aquesta malaltia ja que les infeccions dels fruits joves durant o poc temps després de la floració pot donar lloc a infeccions latents que no produeix símptomes de la malaltia fins que la fruita comença a madurar. Si la parcel·la esta en floració seria convenient fer un tractament amb ENOVIT MEITL (metil tiofanat) si encara no s'ha pogut fer.