

fitosanitaris @ro, SL

syngenta

Telèfon: 973792338 Fax: 973796184

Carrer Progrés, 7
25170 - Torres de Segre (Lleida)

nuriat@fitosanitarisaro.com

TRACTAMENTS FITOSANITARIS

Data: 26 - 4- 2016

PRESSEGUER - NECTARINA:

Els tractaments aniran dirigits a combatre ARANYA, CENDROSA, ARRUFAT, CRIBAT i MONILIA, GRAFOLITA . L'estratègia a seguir serà:

dosis per 1000 l

- + pel control d'aranya: **ABAMECTINA 1.8%** **1,00 l**
- + pel control de CENDROSA: **THIOVIT (sofre mullable 80%)** , **6-7 kg**
- + pel control de ARRUFAT i CRIBAT :
 - METARAM FLOW (T.M.T.D. 50%) TS:15**, **5,00 l**
 - o **MICENE 80 (mancozeb 80%), TS: 28** **2,50 kg**
- + pel control MONILIA I CENDROSA
 - SCORE (difenoconazol 25%) TS: 7** , **0,25 l**
 - o **FLINT (trifloxistrobin 50%), TS: 7** **0,15 kg**
- + pel control de CENDROSA
 - o **TOPAS (penconazol 20%), TS: 14** **0,25 l.**
- + pel control de GRAFOLITA (sols en les finques amb captures, danys la campanya passada o sense confusió).
 - FOSDAN 50 (fosmet 50%), TS: 14** **consultar dosis**



Com a conseqüència de les condicions climàtiques d'aquests últims dies amb humitats continuades es recomana tenir cura pel control de **CRIBAT** i **ARRUFAT**, especialment en les finques on s'observen danys.



RECOMANACIO vigileu les plantacions per si apareixen:

- Re infeccions de pugó verd
- **XANTOMONA ARBORICOLA** en fruiters de pinyol



S'observa en algunes parcel·les fulles com les de la imatge, els símptomes a primera vista poden confondre's amb cribat. Si en trobeu consulteu .

- Fruits amb danys de tisorettes
- Recordeu que es un moment important pel creixement del fruit ja que esta en plena divisió cel·lular, moment en que es definirà al tamany final, per tant es molt importat que la planta estigui ben nodrida, es un bon moment per aplicar, en cas d'observar carències de micró elements, productes com BREXIL COMBI o BREXIL NUTER.

RECORDEU QUE EL MANCOZEB ES FITOTÒXIC ALGUNES VARIETATS DE PERERA

Data: 26 - 4- 2016

PERERA

Els tractaments aniran dirigits a combatre PSIL.LA, STEMPHYLIUM, MOTEJAT, SEPTORIA i CARPOCAPSA ja que les condicions climàtiques també son favorables a la propagació de malalties fúngiques. L'estratègia a seguir serà:

dosis per 1000 l

ABASI (abamectina 1,8%), TS: 28	1,00 l.
LUQSOL 98 (oli parafínic 98%) , TS: --	2,50 l.
KOSSO (imidacloprid 20%), TS: 15	0,75 l.
FOSDAN 50 (fosmet 50%), TS: 14	consultar dosis
FUNGICIDA a determinar segons varietat	

En aquest moments es troben adults, posta blanc i posta groga. Es important controlar molt be aquesta generació per tant la recomanació es fer dues aplicacions en amb un interval de 8-10 dies, preveiem que la primera es pot fer a finals de setmana quant l'estadi dominat sigui ou groc i primeres eclosions, com es veu a les fotografies.



Pel segon tractament la recomanació es:

dosis per 1000 l

ABASI (abamectina 1,8%), TS: 28	1,00 l.
LUQSOL 98 (oli parafínic 98%) , TS: --	2,50 l.
INSEGAR (fenoxicarb 25%), TS: 15	0,60 kg.

STEMPHYLIUM:

Es una malaltia relacionada amb la humitat. Per tant, cada vegada que es produeix una pluja i en parcel·les amb antecedents, es recorda la necessitat de mantenir protegides les plantacions, fins al final de la vegetació les fulles i els fruits són sensibles als seus atac. .

SEPTORIA: En finques amb antecedents cal vigilar les humitats ambientals.

POMERA

Els tractaments aniran dirigits a combatre **CENDROSA** , **MOTEJAT** i **CARPOCAPSA**. L'estratègia a seguir serà:

dosis per 1000 l

✚ pel control de **CENDROSA** i **MOTA**:

ATEMI (ciproconazol 10%), TS: 14

150 cc

✚ pel control de **CARPOCAPSA**

FOSDAN 50 (fosmet 50%), TS: 14

consultar dosis

PICADOR (cipermetrina 10%), TS: 14

1,00 l.

o, en les finques amb captures, danys la campanya passada o sense confusió

CORAGEN (Clorantraniliprol 20%), TS: 14

200 cc

RECOMANACIO: un cop acabada la floració vigileu les plantacions i tractar tan bon punt es detectin els primers individus de pugó gris



NOTA: Per qualsevol dubte consulteu al servei tècnic