

TRACTAMENTS EN PREFLORACIÓ

PRESSEGUER - NECTARINA:



Els tractaments aniran dirigits a combatre PUGÓ VERD, POLL SAN JOSÉ i MALALTIES, es farà a l'estat fenològic D. L'estratègia a seguir serà :

LUQSOL (oli de parafina 83%) a 1 l/hl + **TEPPEKI** (flonicamida 50%) a 140 gr./ha + **BRAI** (piriproxifen 10%) a 50 cc /hl + **CUPROCOL** (oxiclorur de coure 70%) a 250 cc/hl

S'està observant en parcel·les de la zona , la presència d'altres tipus de cotxinilla, per això es recomanable la utilització del PIRIPROXIFEN per eliminar població ja que durant el període vegetatiu és difícil el seu control.

En varietats de Nectarina o Presseguer que l'anterior campanya van tenir problemes importants de CENDROSA, es convenient afegir un antiòidi:

EMINENT (tetraconazol 10%) a la dosis de 50 cc/hl o

DOMARK (tetraconazol 12,5%) a la dosis de 40 cc/hl

NOTA:

- 1.- ES IMPORTANT QUE LA DESPESA DE BROU SIGUI COM A MÍNIM DE 800 LITRES PER HA.
- 2.- EN CAS DE PROBLEMES IMPORTANTS D'ANARSIA O GRAPHOLITA DURANT LA CAMPANYA PASSADA CONSULTAR AL SERVEI TÈCNIC