

Data: 4 - 4- 2016

PRESSEGUER - NECTARINA:



GRAFOLITA:

En aquest moment ha començat el vol de la 1^a generació de GRAFOLITA a la nostra zona i s'estan observant vols molt elevats d'aquest lepidòpter. És preveu que l'acumulació dels 80 graus dia necessaris per l'eclosió de les primeres postes serà finals de setmana.



Per tant, l'estratègia a seguir en general serà:

dosis per 1000 l

MICENE 80 (mancozeb 80%), TS: 28	2,50 kg
THIOVIT (sufre mullable 80%) , TS: --	6,25 kg
FLINT (trifloxistrobin 50%), TS: 7	0,15 kg
FOSDAN (fosmet 50%), TS: 14	consulteu dosis d'utilització
KARATE ZEON (lambda cihalotrin 1.5%), TS: 7	0.75 l

En cas de tenir trampes instal·lades a les finques consulteu l'estratègia

RECORDEU QUE EL MANCOZEB ES FITOTÒXIC ALGUNES VARIETATS DE PERERA

PERER: PSIL·LA

En aquests moments, s'observen larves de diferents estadis corresponents a la primera generació de Psil·la. A partir de l'estadi de **CAIGUDA DE PÈTALS**, serà el moment adient per fer el tractament :

	<u>dosis per 1000 l</u>
AGRIMEC (abamectina 1,8%), TS: 28	1,00 l.
LUQSOL 98 (oli parafínic 98%) , TS: --	2,50 l.
INSEGAR (fenoxicarb 25%), TS: 21	0,60 kg
FONGICIDA a determinar segons varietat	



CONSIDERACIONS:

- 1.- Es té que utilitzar **VOLUMS ALTS D'AIGUA** (1000 - 1200 l./ ha.)
- 2.- Es **CONVENIENT** realitzar la dissolució en una galleda neta, **AFEGINT PRIMER L'OLI BLANC** i després **L'ABAMECTINA**, per abocar-ho posteriorment a la màquina.
- 3.- Dins d'un interval de 15 dies, **NO ES POT TRACTAR AMB CAPTAN**, però es pot utilitzar TMTD,. **No es pot barrejar amb DODINA o SOFRE.**

NOTA:

Seria molt recomanable la instal·lació de trampes amb feromona per fer el seguiment del vol dels lepidòpters (Anarsia, Grafolita, Carpocapsa) a les vostres finques, per tal de poder avaluar i escollir millor les estratègies de lluita.