



	<b>10 – 20 % F</b>	<b>40-60% F</b>	<b>10-15 DDCP</b> ( Després de caiguda de pètals )
<b>ABATE FETEL</b>	<b>BA+GA4+GA7 (PROMALIN)</b>	<b>BA+GA4+GA7 (PROMALIN)</b>	<b>REGALIS</b>
<b>Opció 1</b>	250 cc	250 cc	1 KG
	<b>GA4+GA7 (NOVAGIB)</b>	<b>GA4+GA7 (NOVAGIB)</b>	
<b>Opció 2</b>	500 cc	500 cc	1 KG

Una altra alternativa per la varietat <b>CONFERENCE</b>	<b>10 – 20 % F</b>	<b>40 -60% F</b>	<b>15-20 DDCP</b> (Després de caiguda de pètals )
<b>VARIETAT</b>	<b>PROMALIN</b>	<b>PROMALIN</b>	<b>PACLOBUTRAZOL o REGALIS</b>
	250 cc	250 cc	Entre 1 –1.5 litres

**MOTA o SEPTORIA :** es recomana barrejar **SCORE** ( DIFECONAZOL 25% ) a les varietats sensibles.

**HOPLOCAMPA:** en finques amb problemes aplicar **KARATE**.

**FOC BACTERIÀ:** Recordar que l'època de floració és la de màxima sensibilitat per aquesta malaltia. Productes biològics autoritzats contra aquesta malaltia: *Bacillus subtilis* i *Aureobasidium pullulans* .

En postfloració es poden aplicar activadors de defenses de les plantes: Fosetil- Al.



En general en les parcel·les vigoroses s'ha de controlar el vigor per evitar una purga excessiva, es aconsella aplicar un regulador de creixement als 15-20 dies després de caiguda de pètals.

**NOTA:** en cas de glaçada aplicar el més aviat possible giberelina (a les varietats tolerables) i aminoàcid .

<b>GA3 pastilla</b>	<b>GA3 Líquida</b>
1 p	60 cc
2 p	120 cc
5 p	300 cc
16 p	1 L

En cas de dubte, ja que el quallat es un tema molt complex i diferent per cada parcel·la, consulteu al servei tècnic

## **POMERA: TRACTAMENTS EN PREFLORACIÓ**

Els tractaments aniran dirigits a combatre POLL DE SAN JOSE , el PUGÓ ROSAT, MOTA, CENDROSA i altres fongs; en l'estadi fenològic E (botó rosa). L'estratègia a seguir serà amb el següent tractament:



**LUQSOL** (oli de parafina 83%) a 1 l/hl +  
**TEPPEKI** (flonicamida 50%) a 140 gr./ha +  
**BRAI** (piriproxifen 10%) a 50 cc /hl +  
**CUPROCOL** (oxiclorur de coure 70%) a 250 cc/hl +  
**SCORE** (difenconazol 25%) a 150-200 cc/hl

## **FRUITERS D'OS: PRESSEGUER, NECTARINA , AMETLLER, ...**

**MONILIA, ARRUFAT I FUSICOCUM** (brindilles seques): Cal tractar amb fungicides específics després de pluges. RECOMANEM, per les males condicions climàtiques que s'estan donant durant aquest període, afegir al tractament un aminoàcid o adob foliar

**GRAFOLITA:** S'han capturat els primers adults. Les finques a on tinguin previst instal·lar confusió sexual cal que ho facin el més aviat possible.